إذا كنت تعاني من حمى تصل درجة حرارتها إلى 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى:



1. **اتصل بطبیب السرطان الخاص بك على الفور** - حتى في عطلة نهاية الأسبوع أو العطلات أو في منتصف الليل.

لا تتناول الأدوية التي تقلل الحمى مثل: الأسبرين (aspirin)، أو الأسينامينوفين (ibuprofen) (تايلينول) (Tylenol)، أو الإيبوبروفين (acetaminophen) (أدفيل (Advil))، موترين (Motrin))، أو النابروكسين (naproxen) (أليف (Aleve)) دون إذن طبيبك.

- 2. إذا لم يتصل بك أحد خلال 20 دقيقة، فاذهب إلى أقرب قسم طوارئ (Emergency Department, ED). اتصل بعيادة طبيبك مرة أخرى وأخبر هم بقسم الطوارئ الذي ستذهب إليه.
- 3. إذا ذهبت إلى قسم الطوارئ، فبمجرد وصولك أخبر موظفي تسجيل الوصول وممرضة الرعاية الأولية في قسم الطوارئ بما يلى:
 - إذا كنت تتناول علاج السرطان
 - اسم طبيب السرطان الخاص بك
 - إذا كانت لديك حمى وهي حالة طارئة

إذا كنت تعاني من الحمى، فتأكد من إخبار موظفي تسجيل الدخول في قسم الطوارئ وممرضة الرعاية الأولية على الفور. فالحمى تعني احتمال إصابتك بالعدوى. يمكن أن تكون هذه مشكلة مهددة للحياة ويجب أن يتم فحصك بسرعة.

إذا اعتقد طبيبك أنك مريض جدًا، فقد يطلب منك الذهاب إلى قسم الطوارئ في سيارة اسعاف. إذا كان الأمر كذلك، فهذا من أجل سلامتك.

لا تنس أن تعطي موظفي قسم الطوارئ نسخة من قائمة الأدوية الخاصة بك.

 طبيبي:
رقم هاتف طبيبي:

اتصل بالرقم 911 إذا كانت لديك أي مشاكل تشعرك بأن حالتك هي حالة طارئة.

إذا اتصلت عندما تكون عيادة طبيبك مغلقة، فيجب أن تكون متصلاً بخدمة الرد لدينا. إذا لم تتمكن من الوصول إلى مركز UH Seidman Cancer Center بعد ساعات العمل، أو في عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية، فيمكنك الاتصال بخدمة الرد مباشرة على الرقم 2902-669-877.





اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك:

علامات العدوى التي قد تشمل:

- حمى تصل إلى 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى
 - رعشة أو قشعريرة أو تعرق جديد أو يزداد سوءًا
- احمرار، وجع، تصريف (قيح)، ألم أو تورم في أي منطقة، بما في ذلك الجروح والمنافذ والمواضع الوريدية
 - ضيق في التنفس جديد أو يزداد سوءًا
 - طفح جلدي أو تقرحات جديدة على جلدك
 - التهاب الحلق، تقرحات الفم الجديدة أو بقع بيضاء في فمك
 - ألم الجيوب الأنفية أو الضغط أو احتقان الأنف
 - القيء (التقيؤ)

أسباب أخرى للاتصال بطبيبك:

- عدم القدرة على تناول الطعام أو الشراب لمدة
 12 ساعة
 - النزيف أو الكدمات الجديدة
 - تغيرات جلدية جديدة، طفح جلدي أو بثور

• دم أو بول غائم

- الحاجة المتكررة للتبول أو الشعور بألم أو حرقان عند التبول
- سعال جديد، تغير في السعال أو سعال مع مخاط أخضر أو أصفر (بلغم)
 - إفرازات مهبلية أو حكة غير طبيعية بالنسبة لك
 - الرقبة المتيبسة
 - 3 مرات أو أكثر من التبرز برازًا رخوًا ومانيًا خلال 24 ساعة (الإسهال)
 - ألم جديد
- الارتباك أو الشعور بالنعاس الشديد أو القلق دون سبب
 - المخاوف أو الأسئلة
- الأعراض أو الآثار الجانبية الجديدة أو التي تزداد سوءًا

